

# Wasserkäfer (z. Bsp. Braunfüßiger Teichkäfer *Hydrobius fuscipes*)

## Nahrung

Fallaub, Wasserpflanzen  
bewegen sich an der Wasseroberfläche, die Bewegungen  
sind aber anders als beim Taumelkäfer.  
Larve: Kleinkrebse

## Feinde

Die Larven haben viele Feinde: alle räuberischen  
Insektenlarven wie Wasserskorpione, Libellenlarven,  
Gelbrandkäferlarve

## Größe

Adultes Tier: 6-9mm, etwas größer als ein Taumelkäfer

## Sauerstoffbedarf

gering, ab 2mg/l , deswegen auch in sonnigen, stehenden  
Gewässern vorhanden

## Allgemeines

Man findet den Käfer besonders im Frühjahr.  
Die Larve lebt räuberisch in der Nähe der Wasseroberfläche  
an Wasserpflanzen und frisst kleine Krebse. Die Larve  
verpuppt sich meist im Juli, schlüpft im August. Der Käfer  
überwintert.



**ABBILDUNG 1: BRAUNFÜßIGER  
WASSERKÄFER**

[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hydrobius\\_fuscipes?uselang=de#/media/File:Braunf%C3%BC%C3%9Figer\\_Wasserk%C3%A4fer\\_Hydrobius\\_fuscipes\\_0129.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hydrobius_fuscipes?uselang=de#/media/File:Braunf%C3%BC%C3%9Figer_Wasserk%C3%A4fer_Hydrobius_fuscipes_0129.jpg)



**ABBILDUNG 2: WASSERKÄFER FRISST  
PFLANZEN**

Von Francisco Welter-Schultes - Eigenes  
Werk, CC0,  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74327426>